



Indgang til pakkeforløb for modernærkekræft i huden

Til brug i almen praksis

Håndtering af symptomer på modernærkekræft i huden

I situationer, hvor praktiserende læge ikke kan stille sikker klinisk godartet diagnose, men heller ikke har klinisk mistanke om kræft af suspekterede elementer, skal patienten tilbydes henvisning til filterfunktion.

Det kan eksempelvis dreje sig om:

- Symptomgivende modernærke (ændring i et eksisterende eller nyttilkommet pigmenteret element, særligt i form, farve og/eller symmetri, og evt. samtidige subjektive gener med ubehag, svie, smerter og kløe)
- Nyopstået eller hurtigvoksende knude i huden, eventuelt pigmenteret og eventuel med sårdannelse

Ved klinisk oplagt modernærkekræft jf. kriterier for henvisning til pakkeforløb, skal der tilbydes henvisning direkte til pakkeforløb for modernærkekræft i huden på plastikkirurgisk afdeling.

Filterfunktion:

Praktiserende speciallæger i dermatologi og plastikkirurgi varetager i udgangspunktet filterfunktion. Hvis patienten ikke kan få en tid til undersøgelse i speciallægepraksis inden for 10 kalenderdage, skal patientens praktiserende læge henvise direkte til filterfunktion på plastikkirurgisk afdeling. I filterfunktion foretages en klinisk undersøgelse og eventuelt excisionsbiopsi, hvis det vurderes at fremskynde forløbet.

Kriterier for henvisning til pakkeforløb

Patienten skal henvises til pakkeforløb, når nedenstående kriterier for indgang til pakkeforløb er opfyldt:

- Klinisk oplagt modernærkekræft, herunder markant ændring i et eksisterende eller nyttilkommet pigmenteret element (kulsort, blandet kulsort og rødbrun eller sløret gråblå knude, eventuelt med sårdannelse)
- Histologisk undersøgelse, som viser modernærkekræft eller mistanke herom
- Mistanke om eller erkendt recidiv (tilbagefald) af tidligere behandlet modernærkekræft

Anamnese (sygehistorie) med nyt element eller med forandring i eksisterende elementer er det mest sensitive symptom på modernærkekræft. Udvikling af nye modernærker skal ses ift. alder. Man udvikler modernærker i løbet af barne- og ungdomsårene, men sjældent efter 40 års alderen. Kløe er det mindst specifikke symptom og opstår ofte i benigne, akvisitte nævi.

Indledende udredning i pakkeforløb for modernærkekræft foregår på plastikkirurgisk afdeling.

Håndtering af recidiv, progression eller nyt tilfælde af modernærkekræft

- I opfølgningsperioden: Henvi til opfølgende afdeling ved symptomer på recidiv eller progression
- Efter opfølgningsperioden: Ved mistanke om recidiv eller progression henvises direkte til nyt pakkeforløb for modernærkekræft
- Ved nyt tilfælde af suspekt modernærke følges anvisningerne for håndtering af symptomer på modernærkekræft

Se mere herom i pakkeforløb for modernærkekræft i huden.

Link til relevant information

Sundhedsstyrelsens [Pakkeforløb for modernærkekræft](#)

Sundhedsstyrelsens læsevejledning [Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer](#)

Sundhedsstyrelsens [Patientpjece om pakkeforløb for modernærkekræft i huden](#)

Sundhedsstyrelsens [Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom](#)

Sundhedsstyrelsens [Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft](#)

Sundhedsstyrelsens [Anbefalinger for den palliative indsats](#)

Danske Selskab for Almen Medicin [Kræftopfølgning i almen praksis](#)

Dansk Melanom Grupper [Kliniske retningslinjer](#)